

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑰ Anmeldenummer: 90109529.9

⑤① Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07D 405/12, A61K 31/44,**  
**/(C07D405/12,311:00,237:00)**

⑱ Anmeldetag: 19.05.90

③① Priorität: 02.06.89/DE 3918041

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 05.12.90 Patentblatt 90/49

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:  
 AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE


⑦① Anmelder: MERCK PATENT GESELLSCHAFT  
 MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG  
 Frankfurter Strasse 250  
 D-6100 Darmstadt(DE)

⑦② Erfinder: Gericke, Rolf, Dr.  
 Mozartstrasse 9

D-6104 Seeheim(DE)  
 Erfinder: Baumgarth, Manfred, Dr.  
 Sachsenstrasse 53  
 D-6100 Darmstadt(DE)  
 Erfinder: Lues, Ingeborg, Dr.  
 Paul-Wagner-Strasse 13  
 D-6100 Darmstadt(DE)  
 Erfinder: De Peyer, Jacques, Dr.  
 Weisenbühlweg 33K  
 CH-3007 Bern(CH)  
 Erfinder: Bergmann, Rolf, Dr.  
 Birkenhag 36  
 D-6101 Reichelsheim(DE)

⑤④ Chromanderivate.

⑤⑦ Die Erfindung betrifft neue Chromanderivate der Formel I



I

EP 0 400 430 A2

worin

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die in Patentanspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben,

sowie ihre Salze zeigen Wirkungen auf das cardiovaskuläre System und können verwendet werden zur Behandlung bzw. Prophylaxe von Herzinsuffizienz, Angina pectoris, Bluthochdruck, Inkontinenz und Alopie.

EP 0 400 430 A2

Chromanderivate

5

10

15

20

25

30

35

40


45

50

## Chromanderivate

Die Erfindung betrifft neue Chromanderivate der Formel I

BEST AVAILABLE COPY



worin

R<sup>1</sup> A,20 R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> jeweils H oder A,R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen auch Alkylen mit 3-6 C-Atomen,R<sup>3</sup> OH, OA oder OAc,R<sup>4</sup> H,R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen auch eine Bindung,25 R<sup>5</sup> Ar oder C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>-R<sup>5</sup>,R<sup>5</sup> Alkenyl oder Alkynyl mit jeweils 2-4 C-Atomen, OH, OA, CHO, CO-A, CS-A, COOH, COOA, COO-alkyl-Ar, CS-OA, NO<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub>, NHA, NA<sub>2</sub>, CN, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, SA, SO-A, SO<sub>2</sub>-A oder Ar,Ar eine unsubstituierte oder eine ein- oder zweifach durch R<sup>10</sup> substituierte Phenylgruppe,R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>10</sup> jeweils H, A, HO, AO, CHO, ACO, CF<sub>3</sub>CO, ACS, HOOC, AOOC, AO-CS, ACOO, A-CS-O,30 Hydroxy-alkyl, Mercapto-alkyl, NO<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub>, NHA, NA<sub>2</sub>, CN, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, AS, ASO, ASO<sub>2</sub>, AO-SO, AO-SO<sub>2</sub>, AcNH, AO-CO-NH, H<sub>2</sub>NSO, HANSO, A<sub>2</sub>NSO, H<sub>2</sub>NSO<sub>2</sub>, HANSO<sub>2</sub>, A<sub>2</sub>NSO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>NCO, HANCO, A<sub>2</sub>NCO, H<sub>2</sub>NCS, HANCS, A<sub>2</sub>NCS, ASONH, ASO<sub>2</sub>NH, AOSONH, AOSO<sub>2</sub>NH, ACO-alkyl, Nitro-alkyl, Cyan-alkyl, A-C(=NOH), A-C(=NNH<sub>2</sub>), H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> oder A<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>,

n 1, 2 oder 3,

35 A Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

-alkyl Alkylen mit 1-6 C-Atomen und

Ac Alkanoyl mit 1-8 C-Atomen oder Aroyl mit 7-11 C-Atomen

bedeuten,

sowie deren Salze.

40 Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, neue Verbindungen mit wertvollen Eigenschaften aufzufinden, insbesondere solche, die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden können.

Es wurde gefunden, daß die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch unbedenklichen Salze bei guter Verträglichkeit wertvolle pharmakologische Eigenschaften besitzen. So zeigen sie Wirkungen auf das cardiovaskuläre System, wobei in der Regel bei niedrigeren Dosen ein selektiver Angriff am Coronarsystem, bei höheren ein blutdrucksenkender Effekt beobachtet werden kann. Am Coronarsystem treten z.B. Widerstandsabnahme und Flußzunahme auf, wobei der Einfluß auf die Herzfrequenz gering bleibt. Weiterhin zeigen die Verbindungen eine relaxierende Wirkung auf verschiedene glattemuskuläre Organe (Gastrointestinaltrakt, Respirationssystem und Uterus). Die Wirkungen der Verbindungen können mit Hilfe an sich bekannter Methoden ermittelt werden, wie sie z.B. in der EP-A1-76075, der EP-A1-173848 oder der

50 AU-A-45547/85 (Derwent Farmdoc Nr. 86081769) sowie von K.S. Meesmann et al., Arzneimittelforschung 25 (11), 1975, 1770-1776, angegeben sind. Als Versuchstiere eignen sich z.B. Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Hunde, Katzen, Affen oder Schweine.

Die Verbindungen können daher als Arzneimittelwirkstoffe in der Human- und Veterinärmedizin verwendet werden. Ferner können sie als Zwischenprodukte zur Herstellung weiterer Arzneimittelwirkstoffe verwen-

det werden.

In den angegebenen Formeln bedeutet A eine vorzugsweise unverzweigte Alkylgruppe mit 1-6, bevorzugt 1-4, insbesondere 1, 2 oder 3 C-Atomen, im einzelnen vorzugsweise Methyl, ferner bevorzugt Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, weiterhin bevorzugt sek.-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Isopentyl (3-Methylbutyl), Hexyl oder Isohexyl (4-Methylpentyl).

Falls R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen Alkylen bedeuten, so ist die Alkylengruppe vorzugsweise unverzweigt, im einzelnen bevorzugt -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, wobei n 3, 4, 5 oder 6 bedeutet.

Die Gruppe "-alkyl" steht vorzugsweise für -CH<sub>2</sub>- oder -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-.

Ac ist vorzugsweise Alkanoyl mit 1-6, insbesondere 1, 2, 3 oder 4 C-Atomen, im einzelnen bevorzugt Formyl oder Acetyl, weiterhin bevorzugt Propionyl, Butyryl, Isobutyryl, Pentanoyl oder Hexanoyl, ferner bevorzugt Benzoyl, o-, m- oder p-Toluy, 1- oder 2-Naphthoyl.

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> sind vorzugsweise jeweils Alkyl, insbesondere jeweils Methyl oder Ethyl, bevorzugt jeweils Methyl, weiterhin sind R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen bevorzugt -(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>- oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-.

Falls R<sup>4</sup> H bedeutet, ist R<sup>3</sup> bevorzugt OH, ferner bevorzugt O-CHO oder O-COCH<sub>3</sub>.

Ar ist vorzugsweise unsubstituiertes Phenyl. Falls Ar eine substituierte Phenylgruppe bedeutet, so ist diese vorzugsweise einfach substituiert.

Der Parameter n ist vorzugsweise 1 oder 2.

Alkenyl ist vorzugsweise Vinyl, ferner bevorzugt 1-Propenyl oder Allyl.

In R<sup>5</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>10</sup> bedeuten vorzugsweise:

20 A: Methyl, ferner Ethyl;

AO: Methoxy, ferner Ethoxy;

ACO: Acetyl, ferner Propionyl;

ACS: Thioacetyl, ferner Thiopropionyl;

AOOC: Methoxycarbonyl, ferner Ethoxycarbonyl;

25 AO-CS: Methoxy-thiocarbonyl, ferner Ethoxythiocarbonyl;

ACOO: Acetoxy, ferner Propionoxy;

ACSO: Thio(no)acetoxy, ferner Thio(no)propionoxy;

Hydroxyalkyl: Hydroxymethyl oder 1- oder 2-Hydroxyethyl;

Mercaptoalkyl: Mercaptomethyl oder 1- oder 2-Mercaptoethyl;

30 NHA: Methylamino, ferner Ethylamino;

NA<sub>2</sub>: Dimethylamino, ferner Diethylamino;

ASO: Methylsulfinyl, ferner Ethylsulfinyl;

ASO<sub>2</sub>: Methylsulfonyl, ferner Ethylsulfonyl;

AO-SO: Methoxy-sulfinyl, ferner Ethoxy-sulfinyl;

35 AO-SO<sub>2</sub>: Methoxy-sulfonyl, ferner Ethoxy-sulfonyl;

Ac-NH: Acetamido, ferner Formamido, Propionamido oder Benzamido;

AO-CO-NH: Methoxycarbonylamino, ferner Ethoxycarbonylamino;

HANSO: Methylaminosulfinyl, ferner Ethylaminosulfinyl

A<sub>2</sub>NSO: Dimethylaminosulfinyl, ferner Diethylaminosulfinyl;

40 HANSO<sub>2</sub>: Methylaminosulfonyl, ferner Ethylaminosulfonyl;

A<sub>2</sub>NSO<sub>2</sub>: Dimethylaminosulfonyl, ferner Diethylaminosulfonyl;

HANCO: N-Methylcarbamoyl, ferner N-Ethylcarbamoyl;

A<sub>2</sub>NOC: N,N-Dimethylcarbamoyl, ferner N,N-Diethylcarbamoyl;

HANCS: N-Methylthiocarbamoyl, ferner N-Ethylthiocarbamoyl;

45 A<sub>2</sub>NCS: N,N-Dimethylthiocarbamoyl, ferner N,N-Diethylthiocarbamoyl;

ASONH: Methylsulfinylamino, ferner Ethylsulfinylamino;

ASO<sub>2</sub>NH: Methylsulfonylamino, ferner Ethylsulfonylamino;

AOSONH: Methoxysulfinylamino, ferner Ethoxysulfinylamino;

AOSO<sub>2</sub>NH: Methoxysulfonylamino, ferner Ethoxysulfonylamino;

50 ACO-alkyl: 2-Oxopropyl, 2-Oxobutyl, 3-Oxobutyl, 3-Oxopentyl;

Nitroalkyl: Nitromethyl, 1- oder 2-Nitroethyl;

Cyanalkyl: Cyanmethyl, 1- oder 2-Cyanethyl;

A-C(=NOH): 1-Oximinoethyl, ferner 1-Oximinoethylpropyl;

A-C(=NNH<sub>2</sub>): 1-Hydrazonoethyl, ferner 1-Hydrazonoethylpropyl.

55 Die Reste R<sup>5</sup> und R<sup>7</sup> stehen vorzugsweise in 6- und 7-Stellung des Chromansystems. Sie können jedoch auch in 5- und 6-, 5- und 7-, 5- und 8-, 6- und 8- sowie 7- und 8-Stellung stehen.

Von den Resten R<sup>5</sup> und R<sup>7</sup> ist vorzugsweise der eine H, während der andere von H verschieden ist. Dieser andere Rest steht vorzugsweise in 6-Stellung, aber auch in 5-, 7- oder 8-Stellung, und ist

vorzugsweise CN oder NO<sub>2</sub>, ferner bevorzugt CHO, ACO (insbesondere Acetyl), CF<sub>3</sub>CO, AOC (insbesondere Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl), ACOO (insbesondere Acetoxy), weiterhin bevorzugt F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>NCO, H<sub>2</sub>NCS oder NH<sub>2</sub>.

Der Rest R<sup>8</sup> ist vorzugsweise H, weiterhin bevorzugt Methyl oder Ethyl.

- 5 R<sup>9</sup> ist bevorzugt Vinyl, Ethinyl, OH, OA (insbesondere Methoxy oder Ethoxy), COOH, COOA (insbesondere Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl), COOCH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, NH<sub>2</sub>, CN oder Phenyl.

Dementsprechend ist R<sup>5</sup> bevorzugt Phenyl, Allyl, Propargyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Ethoxyethyl, Carboxymethyl, Methoxycarbonylmethyl, Ethoxycarbonylmethyl, Benzyloxycarbonylmethyl, 2-Aminoethyl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl, Benzyl.

- 10 Dementsprechend sind Gegenstand der Erfindung insbesondere diejenigen Verbindungen der Formel I, in denen mindestens einer der genannten Reste eine der vorstehend angegebenen bevorzugten Bedeutungen hat. Einige bevorzugte Gruppen von Verbindungen können durch die nachstehenden Formeln Ia bis II ausgedrückt werden, die der Formel I entsprechen und worin die nicht näher bezeichneten Reste die bei der Formel I angegebene Bedeutung haben, worin jedoch

- 15 in Ia R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils A bedeuten;

In Ib R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils CH<sub>3</sub> bedeuten;

in Ic R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen Alkylen mit 3-6 C-Atomen bedeuten;

in Id R<sup>5</sup> Phenyl, Allyl, Propargyl, 2-Hydroxyethyl, 2-AO-ethyl, Carboxymethyl, AO-CO-CH<sub>2</sub>, Benzyloxycarbonylmethyl, 2-Aminoethyl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl oder Benzyl bedeutet;

- 20 in Ie R<sup>5</sup> Phenyl, Allyl, Propargyl, 2-Hydroxyethyl, Carboxymethyl, Methoxycarbonylmethyl, Benzyloxycarbonylmethyl, 2-Aminoethyl, Cyanmethyl oder Benzyl bedeutet;

in If R<sup>5</sup> Allyl bedeutet;

in Ig R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils CH<sub>3</sub> oder zusammen -(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>- oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-.

- 25 R<sup>5</sup> Phenyl, Allyl, Propargyl, 2-Hydroxyethyl, 2-AO-ethyl, Carboxymethyl, AO-CO-CH<sub>2</sub>, Benzyloxycarbonylmethyl, 2-Aminoethyl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl oder Benzyl und

R<sup>8</sup> H oder CH<sub>3</sub> bedeuten;

in Ih R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils CH<sub>3</sub>,

R<sup>5</sup> Phenyl, Allyl, Propargyl, 2-Hydroxyethyl, Carboxymethyl, Methoxycarbonylmethyl, Benzyloxycarbonylmethyl, 2-Aminoethyl, Cyanmethyl oder Benzyl und

- 30 R<sup>8</sup> H bedeuten;

in Ii R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils CH<sub>3</sub>,

R<sup>5</sup> Allyl und

R<sup>8</sup> H bedeuten.

- 35 Weiterhin sind bevorzugt Verbindungen der Formeln I' sowie Ia' bis II', die den Formeln I sowie Ia bis II entsprechen, worin jedoch jeweils zusätzlich R<sup>3</sup> H, OH, OCHO oder OCOCH<sub>3</sub> und R<sup>4</sup> H bedeuten, insbesondere solche Verbindungen der Formeln I' sowie Ia' bis II', worin jeweils zusätzlich R<sup>3</sup> OH und R<sup>4</sup> H bedeuten.

Weiterhin sind bevorzugt Verbindungen der Formeln I'' sowie Ia'' bis II'', die den Formeln I sowie Ia bis II entsprechen, worin jedoch jeweils zusätzlich R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen eine Bindung bedeuten.

- 40 Ferner sind bevorzugt Verbindungen der Formeln I, I', I'', Ia bis II, Ia' bis II' sowie Ia'' bis II'', worin jeweils zusätzlich

(a) R<sup>6</sup> von H verschieden ist und

R<sup>7</sup> H bedeutet;

(b) R<sup>6</sup> von H verschieden ist und in 6-Stellung steht und

- 45 R<sup>7</sup> H bedeutet;

(c) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub>, CN, CHO, ACO, HOOC, AOC, ACOO, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>NCO, H<sub>2</sub>NCS oder NH<sub>2</sub> und

R<sup>7</sup> H bedeutet;

(d) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub>, CN, CHO, ACO, HOOC, AOC, ACOO, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>NCO, H<sub>2</sub>NCS oder NH<sub>2</sub> bedeutet und in 6-Stellung steht und

- 50 R<sup>7</sup> H bedeutet;

(e) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub>, CN, Br oder CH<sub>3</sub>OOC und

R<sup>7</sup> H bedeutet;

(f) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub>, CN, Br oder CH<sub>3</sub>OOC bedeutet und in 6-Stellung steht und

R<sup>7</sup> H bedeutet;

- 55 (g) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub> oder CN und

R<sup>7</sup> H bedeutet;

(h) R<sup>6</sup> NO<sub>2</sub> oder CN bedeutet und in 6-Stellung steht und

R<sup>7</sup> H bedeutet;


(i)  $R^6$  CN und

$R^7$  H bedeutet;


(j)  $R^6$  CN bedeutet und in 6-Stellung steht und  
 $R^7$  H bedeutet.

5 Im Übrigen haben vor- und nachstehend die Reste  $R^1$  bis  $R^8$ , A, "alkyl" und Ac die bei Formel I angegebenen Bedeutungen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.


Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung von Chromanderivaten der Formel I gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Chroman der Formel II




20 worin



30 E Cl, Br, J oder eine reaktionsfähig veresterte OH-Gruppe bedeuten und  
 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^6$ ,  $R^7$  und  $R^8$  die bei Formel I angegebenen Bedeutungen haben,  
 mit einer Verbindung der Formel III



40 worin  $R^5$  die bei Formel I angegebene Bedeutung hat oder mit einem ihrer reaktionsfähigen Derivate umgesetzt oder daß man eine Verbindung der Formel IV



55 worin  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^6$ ,  $R^7$  und  $R^8$  die bei Formel I angegebenen Bedeutungen haben,  
 oder eines ihrer reaktionsfähigen Derivate  
 mit einer Verbindung der Formel

E- $R^5$  V

worin  $R^5$  und E die bei Formel I bzw. bei Formel II angegebenen Bedeutungen haben


oder einen ihrer reaktionsfähigen Derivate umsetzt  
und/oder daß man eine Verbindung der Formel I, worin R<sup>3</sup> OH und R<sup>4</sup> H bedeutet, dehydratisiert und/oder  
daß man in einer Verbindung der Formel I einen oder mehrere der Reste R<sup>3</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und/oder R<sup>7</sup> in andere  
Reste R<sup>3</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und/oder R<sup>7</sup> umwandelt und/oder daß man eine basische Verbindung der Formel I durch  
5 Behandeln mit einer Säure in eines ihrer Säureadditionssalze umwandelt.

Die Verbindungen der Formel I werden im übrigen nach an sich bekannten Methoden hergestellt, wie  
sie in der Literatur (z.B. in den Standardwerken wie Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie,  
Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart; Organic Reactions, John Wiley & Sons, Inc., New York; sowie in den oben  
angegebenen Patentanmeldungen) beschrieben sind, und zwar unter Reaktionsbedingungen, die für die  
10 Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann man auch von an sich bekannten, hier  
nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch machen.

Die Ausgangsstoffe können gewünschtenfalls auch in situ gebildet werden, derart, daß man sie aus  
dem Reaktionsgemisch nicht isoliert, sondern sofort weiter zu den Verbindungen der Formel I umsetzt.

Vorzugsweise werden die Verbindungen der Formel I durch Reaktion von Verbindungen der Formel II  
15 mit Verbindungen der Formel III hergestellt, zweckmäßig in Gegenwart eines inerten Lösungsmittels bei  
Temperaturen zwischen etwa 0 und 150 °.

Ausgangsstoffe der Formel II mit





(3,4-Epoxy-chromane) sind bevorzugt.

25 Die Ausgangsstoffe II und III sind in der Regel bekannt (vgl. z.B. DE-OS 37 26 261). Sofern sie nicht  
bekannt sind, können sie nach an sich bekannten Methoden hergestellt werden. So sind die Ausgangsstoffe  
der Formel II



erhältlich durch Umsetzung von 2-Hydroxyacetophenonen der Formel 2-HO-R<sup>6</sup>R<sup>7</sup>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>-COCH<sub>3</sub> mit Ketonen  
der Formel R<sup>1</sup>-CO-R<sup>2</sup> zu entsprechenden 4-Chromanonen der Formel VIa

35



45 gegebenenfalls Kondensation mit Aldehyden der Formel R<sup>11</sup>-CHO (R<sup>11</sup> = Alkyl mit 1-5 C-Atomen) zu 3-  
Alkyliden-4-chromanonen der Formel Vib, Reduktion, z.B. mit NaBH<sub>4</sub>, zu Chromanolen der Formel Vic,  
Dehydratisierung, z.B. mit p-Toluolsulfonsäure, zu Chromenen der Formel Vid und Oxydation, z.B. mit 3-  
Chlorperbenzoesäure. Die letztgenannte Oxydation kann auch mehrstufig erfolgen. So kann man, z.B. mit  
50 N-Bromsuccinimid in wäßriger Lösung, zunächst die Bromhydrine der Formel Vie herstellen und aus diesen  
anschließend mit einer Base, z.B. Natronlauge, HBr abspalten.

Man kann die Chromene der Formel Vid auch erhalten durch Kondensation von Salicylaldehyden der  
Formel 2-HO-R<sup>6</sup>R<sup>7</sup>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>-CHO mit Ketonen der Formel R<sup>1</sup>-CO-CH<sub>2</sub>-R<sup>2</sup> zu Hydroxyketonen der Formel 2-HO-  
R<sup>6</sup>R<sup>7</sup>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>-CH=CR<sup>8</sup>-CO-R<sup>1</sup>, Umsetzung mit Organo-Li-Verbindungen der Formel R<sup>2</sup>-Li, nachfolgende Hydro-  
lyse zu Diolen der Formel 2-HO-R<sup>6</sup>R<sup>7</sup>C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>-CH=CR<sup>8</sup>-CR<sup>1</sup>R<sup>2</sup>-OH und Cyclisierung unter Wasserabspaltung.


55 In Verbindungen der Formeln II (-X-Y- = -CHE-CR<sup>3</sup>R<sup>8</sup>-) und V kommen als "reaktionsfähig veresterte  
OH-Gruppen" insbesondere die Ester mit Alkylsulfonsäuren (worin die Alkylgruppe 1-6 C-Atome enthält)  
oder mit Arylsulfonsäuren (worin die Arylgruppe 6-10 C-Atome enthält) in Betracht. Diese Verbindungen  
sind erhältlich aus den 4-Chromanolen der Formel Vic bzw. aus Verbindungen der Formel R<sup>5</sup>-OH durch

Umsetzung mit einem anorganischen Säurehalogenid, wie  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{PBr}_3$ ,  $\text{SOCl}_2$  oder  $\text{SOBr}_2$ , oder mit einem Sulfonsäurechlorid, wie Methan- oder p-Toluolsulfonsäurechlorid.

Als reaktionsfähige Derivate von III eignen sich die entsprechenden Salze, z.B. die Na- oder K-Salze, die auch in situ entstehen können.

- Bei der Umsetzung von II mit III ist es zweckmäßig, in Gegenwart einer Base zu arbeiten. Als Basen eignen sich z.B. Alkalimetall- oder Erdalkalimetall-hydroxide, -carbonate, -alkoholate, -hydride oder auch -amide wie  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$ , Na- oder K-methylat, -ethylat oder tert.-butylat,  $\text{NaH}$ ,  $\text{KH}$ ,  $\text{CaH}_2$ ,  $\text{NaNH}_2$ ,  $\text{KNH}_2$ , ferner organische Basen wie Triethylamin oder Pyridin, die auch im Überschuß angewendet werden können und dann gleichzeitig als Lösungsmittel dienen. Als inerte Lösungsmittel eignen sich insbesondere Alkohole wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-Butanol oder tert.-Butanol; Ether wie Diethylether, Diisopropylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan; Glykolether wie Ethylenglykolmonomethyl- oder -monoethylether (Methylglykol oder Ethylglykol), Ethylenglykoldimethylether (Diglyme); Ketone wie Aceton oder Butanon; Nitrile wie Acetonitril; Nitroverbindungen wie Nitromethan oder Nitrobenzol; Ester wie Ethylacetat; Amide wie Dimethylformamid (DMF), Dimethylacetamid oder Phosphorsäurehexamethyltriamid; Sulfoxide wie Dimethylsulfoxid (DMSO); chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, Chloroform, Trichlorethylen, 1,2-Dichlorethan oder Kohlenstofftetrachlorid; Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol. Weiterhin eignen sich Gemische dieser Lösungsmittel untereinander.

Das Epoxid II



- kann auch in situ hergestellt werden, z.B. durch Einwirkung einer Base auf das entsprechende Bromhydrin Vle.

Eine besonders bevorzugte Arbeitsweise besteht darin, daß man einen Alkohol (z.B. Ethanol) als Lösungsmittel verwendet und eine organische Base (z.B. Pyridin) hinzusetzt, wobei man zweckmäßig etwa 0,5 bis 20 Std. kocht.

- Verbindungen der Formel I können auch hergestellt werden, indem man eine Verbindung der Formel IV mit einer Verbindung der Formel V umsetzt, zweckmäßig unter den Bedingungen einer N-Arylierung oder N-Alkylierung in Gegenwart oder Abwesenheit eines der genannten inerten Lösungsmittel (z.B. Aceton) bei Temperaturen zwischen etwa  $0^\circ$  und etwa  $150^\circ$ , wobei man vorteilhaft in Gegenwart einer der genannten Basen (z.B. Kaliumcarbonat) arbeitet.

- Die Herstellung der Ausgangsstoffe der Formel IV ist z.B. in der EP-A-0273262 beschrieben; sie gelingt leicht z.B. durch Reaktion einer Verbindung der Formel II mit 3-Hydroxy-1,6-dihydro-6-pyridazinon (= 3,6-Pyridazindiol; Formel III, aber H an Stelle von  $\text{R}^5$ ). Die Ausgangsstoffe der Formel V sind in der Regel bekannt.

- An Stelle der Ausgangsstoffe der Formeln IV oder V können auch ihre reaktionsfähigen Derivate eingesetzt werden, z.B. an Stelle von IV die entsprechenden K- oder N-Salze, an Stelle von 2-Amino- oder 2-Hydroxy-1-E-alkenen der Formel V [ $\text{R}^5 = -\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{C}_{n-2}\text{H}_{2n-4}$  bzw.  $-\text{CH}_2-\text{CHOH}-\text{C}_{n-2}\text{H}_{2n-4}$ ] die entsprechenden Alkylenimine (Aziridin, 2-Methylaziridin) bzw. die entsprechenden Alkylenoxide (Ethylenoxid, Propylenoxid); in den letztgenannten Fällen kann es zweckmäßig sein, unter erhöhtem Druck (bis zu etwa 100 bar) zu arbeiten.

- Eine Verbindung der Formel I, worin  $\text{R}^3 = \text{OH}$  und  $\text{R}^4 = \text{H}$  ist, kann durch Behandeln mit einem Dehydratisierungsmittel in eine Verbindung der Formel I, worin  $\text{R}^3$  und  $\text{R}^4$  zusammen eine Bindung bedeuten, umgewandelt werden. Das gelingt z.B. durch Einwirkung einer der angegebenen Basen, z.B.  $\text{NaH}$ , in einem der angegebenen Lösungsmittel, z.B. DMSO, bei Temperaturen zwischen  $0$  und  $150^\circ$ .

- Die Dehydratisierung kann auch mehrstufig erfolgen, indem man z.B. das Carbinol I ( $\text{R}^3 = \text{OH}$ ,  $\text{R}^4 = \text{H}$ ) in einen Ester, z.B. einen Sulfonsäureester wie einen Camphersulfonsäureester, umwandelt und diesen mit einer Base, z.B. mit  $\text{NaOH}$ , behandelt.

Weiterhin kann man in einer Verbindung der Formel I einen oder mehrere der Reste  $\text{R}^3$ ,  $\text{R}^5$ ,  $\text{R}^6$  und/oder  $\text{R}^7$  in andere Reste  $\text{R}^3$ ,  $\text{R}^5$ ,  $\text{R}^6$  und/oder  $\text{R}^7$  umwandeln.

- Beispielsweise ist es möglich, daß man ein H-Atom mittels einer Halogenierung durch ein Halogenatom oder mittels einer Nitrierung durch eine Nitrogruppe ersetzt und/oder eine Estergruppe zu einer Carboxylgruppe verseift und/oder eine Benzyloxycarbonylgruppe zu einer Carboxylgruppe hydrogenolysiert (z.B. an Pd-C in Methanol) und/oder eine Carboxylgruppe verestert und/oder eine Nitrogruppe zu einer Aminogruppe reduziert und/oder eine Amino- oder Hydroxygruppe alkyliert oder acyliert und/oder eine Cyangruppe



(z.B. mit HCl in Wasser/Methanol bei 20-100°) in eine Carboxylgruppe oder (z.B. mit Raney-Nickel in Wasser/Essigsäure/Pyridin in Gegenwart von Natriumphosphat) in eine Formylgruppe oder (z.B. mit KOH in tert.-Butanol) in eine Carbamoylgruppe oder (z.B. mit H<sub>2</sub>S in Pyridin/Triethylamin) in eine Thiocarbamoylgruppe umwandelt.

5 Eine Nitrierung gelingt unter üblichen Bedingungen, z.B. mit einem Gemisch aus konzentrierter HNO<sub>3</sub> und konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei Temperaturen zwischen 0 und 30°.

Eine Halogenierung kann z.B. mit elementarem Chlor oder Brom in einem der üblichen inerten Lösungsmittel bei Temperaturen zwischen etwa 0 und 30° durchgeführt werden.

10 Eine primäre oder sekundäre Aminogruppe und/oder eine OH-Gruppe kann durch Behandeln mit alkylierenden Mitteln in die entsprechende sekundäre oder tertiäre Aminogruppe und/oder Alkoxygruppe umgewandelt werden. Als alkylierende Mittel eignen sich z.B. Verbindungen der Formeln A-Cl, A-Br oder A-J oder entsprechende Schwefelsäure- oder Sulfonsäureester wie Methylchlorid, -bromid, -jodid, Dimethylsulfat, Methyl-p-toluolsulfonat. Ferner kann man z.B. eine oder zwei Methylgruppen mit Formaldehyd in Gegenwart von Ameisensäure einführen. Die Alkylierung wird zweckmäßig in Gegenwart oder Abwesenheit  
15 eines der genannten inerten Lösungsmittel, z.B. DMF, bei Temperaturen zwischen etwa 0° und etwa 120° vorgenommen, wobei auch ein Katalysator zugegen sein kann, vorzugsweise eine Base wie Kalium-tert.-butylat oder NaH.

Als acylierende Mittel zur Acylierung von Amino- oder Hydroxygruppen eignen sich zweckmäßig die Halogenide (z.B. Chloride oder Bromide) oder Anhydride von Carbonsäuren der Formel Ac-OH, z.B. Acetanhydrid, Propionylchlorid, Isobutyrylbromid, Ameisensäure/Essigsäureanhydrid, Benzoylchlorid. Der  
20 Zusatz einer Base wie Pyridin oder Triethylamin bei der Acylierung ist möglich. Man acyliert zweckmäßig in Gegenwart oder Abwesenheit eines inerten Lösungsmittels, z.B. eines Kohlenwasserstoffs wie Toluol, eines Nitril wie Acetonitril, eines Amids wie DMF oder eines Überschusses einer tertiären Base wie Pyridin oder Triethylamin bei Temperaturen zwischen etwa 0° und etwa 160°, vorzugsweise zwischen 20° und 120°.  
25 Eine Formylierung gelingt auch mit Ameisensäure in Gegenwart von Pyridin bzw. mit einem Gemisch von Ameisensäure und Acetanhydrid.

Eine Base der Formel I kann mit einer Säure in das zugehörige Säureadditionssalz übergeführt werden. Für diese Umsetzung kommen insbesondere Säuren in Frage, die physiologisch unbedenkliche Salze liefern. So können anorganische Säuren verwendet werden, z.B. Schwefelsäure, Salpetersäure, Halogenwasserstoffsäuren wie Chlorwasserstoffsäure oder Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäuren wie Orthophosphorsäure, Sulfaminsäure, ferner organische Säuren, insbesondere aliphatische, alicyclische, araliphatische, aromatische oder heterocyclische ein- oder mehrbasige Carbon-, Sulfon- oder Schwefelsäuren, z.B. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Pivalinsäure, Diethylessigsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Pimelinsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Milchsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Benzoesäure, Salicylsäure, 2-  
30 oder 3-Phenylpropionsäure, Citronensäure, Glucosäure, Ascorbinsäure, Nicotinsäure, Isonicotinsäure, Methan- oder Ethansulfonsäure, Ethandisulfonsäure, 2-Hydroxyethansulfonsäure, Benzolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Naphthalin-mono- und -disulfonsäuren, Laurylschwefelsäure. Salze mit physiologisch nicht unbedenklichen Säuren, z.B. Pikrate, können zur Aufreinigung der Verbindungen der Formel I verwendet werden.

40 Die Verbindungen der Formel I können ein oder mehrere chirale Zentren besitzen. Sie können daher bei ihrer Herstellung als Racemate oder, falls optisch aktive Ausgangsstoffe verwendet werden, auch in optisch aktiver Form erhalten werden. Weisen die Verbindungen zwei oder mehr chirale Zentren auf, dann können sie bei der Synthese als Gemische von Racematen anfallen, aus denen man die einzelnen Racemate, beispielsweise durch Umkristallisieren aus inerten Lösungsmitteln, in reiner Form isolieren kann.  
45 So haben z.B. Verbindungen der Formel I, worin R<sup>1</sup> = R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> = OH und R<sup>4</sup> = H ist, zwei chirale Zentren; bei der Herstellung durch Reaktion von II mit III entsteht jedoch ganz überwiegend nur ein Racemat mit trans-Stellung der OH-Gruppe in 3-Stellung und der 1-R<sup>5</sup>-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy-Gruppe in 4-Stellung. Erhaltene Racemate können, falls erwünscht, nach an sich bekannten Methoden mechanisch, chemisch oder biochemisch in ihre Enantiomeren getrennt werden. So können aus dem Racemat durch  
50 Umsetzung mit einem optisch aktiven Trennmittel Diastereomere gebildet werden. Als Trennmittel für basische Verbindungen der Formel I eignen sich z.B. optisch aktive Säuren, wie die D- und L-Formen von Weinsäure, Dibenzoylweinsäure, Diacetylweinsäure, Camphansäure, Camphersulfonsäuren, Mandelsäure, Äpfelsäure oder Milchsäure. Carbinole (I, R<sup>3</sup> = OH) können ferner mit Hilfe chiraler Acylierungsreagenzien, z.B. D- oder L- $\alpha$ -Methylbenzylisocyanat, verestert und dann getrennt werden (vgl. EP-A1-120428). Die  
55 verschiedenen Formen der Diastereomeren können in an sich bekannter Weise, z.B. durch fraktionierte Kristallisation, getrennt, und die Enantiomeren der Formel I können in an sich bekannter Weise aus den Diastereomeren in Freiheit gesetzt werden. Enantiomerentrennungen gelingen ferner durch Chromatographie an optisch-aktiven Trägermaterialien.

Die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch unbedenklichen Salze können zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen verwendet werden, insbesondere auf nichtchemischem Wege. Hierbei können sie zusammen mit mindestens einem festen, flüssigen und/oder halbflüssigen Träger- oder Hilfsstoff und gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Wirkstoff(en) in eine geeignete Dosierungsform gebracht werden.

Gegenstand der Erfindung sind ferner Mittel, insbesondere pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I und/oder eines ihrer physiologisch unbedenklichen Salze.

Diese Zubereitungen können als Arzneimittel in der Human- oder Veterinärmedizin verwendet werden. Als Trägerstoffe kommen organische oder anorganische Substanzen in Frage, die sich für die enterale (z. B. orale), parenterale oder topische Applikation eignen und mit den neuen Verbindungen nicht reagieren, beispielsweise Wasser, pflanzliche Öle, Benzylalkohole, Polyethylenglykole, Glycerintriacetat, Gelatine, Kohlehydrate wie Lactose oder Stärke, Magnesiumstearat, Talk, Lanolin, Vaseline. Zur oralen Anwendung dienen insbesondere Tabletten, Dragees, Kapseln, Sirupe, Säfte oder Tropfen, zur rektalen Anwendung Suppositorien, zur parenteralen Anwendung Lösungen, vorzugsweise ölige oder wässrige Lösungen, ferner Suspensionen, Emulsionen oder Implantate, für die topische Anwendung Salben, Cremes, Pasten, Lotionen, Gele, Sprays, Schäume, Aerosole, Lösungen (z.B. Lösungen in Alkoholen wie Ethanol oder Isopropanol, Acetonitril, DMF, Dimethylacetamid, 1,2-Propandiol oder deren Gemischen untereinander und/oder mit Wasser) oder Puder. Die neuen Verbindungen können auch lyophilisiert und die erhaltenen Lyophilisate z. B. zur Herstellung von Injektionspräparaten verwendet werden. Insbesondere für die topische Anwendung kommen auch liposomale Zubereitungen in Betracht. Die angegebenen Zubereitungen können sterilisiert sein und/oder Hilfsstoffe wie Gleit-, Konservierungs-, Stabilisierungs- und/oder Netzmittel, Emulgatoren, Salze zur Beeinflussung des osmotischen Druckes, Puffersubstanzen, Farb-, Geschmacks- und/oder Aromastoffe enthalten. Sie können, falls erwünscht, auch einen oder mehrere weitere Wirkstoffe enthalten, z. B. ein oder mehrere Vitamine.

Die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch unbedenklichen Salze können an Menschen oder Tiere, insbesondere Säugetiere wie Affen, Hunde, Katzen, Ratten oder Mäuse verabreicht und bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie bei der Bekämpfung von Krankheiten verwendet werden, insbesondere bei der Therapie und/oder Prophylaxe von Störungen des kardiovaskulären Systems, insbesondere dekompensierter Herzinsuffizienz, Angina pectoris, Arrhythmie, peripheren oder cerebralen Gefäßerkrankungen, sowie Krankheitszuständen, die mit Bluthochdruck verbunden sind, ferner von Erkrankungen, die mit Veränderungen der nicht-vaskulären Muskulatur verbunden sind, z.B. Asthma, Inkontinenz der Harnblase.

Dabei werden die erfindungsgemäßen Substanzen in der Regel in Analogie zu bekannten Antianginosa bzw. Blutdrucksenkern, z. B. Nicorandil oder Cromakalim verabreicht, vorzugsweise in Dosierungen zwischen etwa 0,01 und 5 mg, insbesondere zwischen 0,02 und 0,5 mg pro Dosierungseinheit. Die tägliche Dosierung liegt vorzugsweise zwischen etwa 0,0001 und 0,1, insbesondere zwischen 0,0003 und 0,01 mg/kg Körpergewicht. Die spezielle Dosis für jeden bestimmten Patienten hängt jedoch von den verschiedensten Faktoren ab, beispielsweise von der Wirksamkeit der eingesetzten speziellen Verbindung, vom Alter, Körpergewicht, dem allgemeinen Gesundheitszustand, Geschlecht, von der Kost, vom Verabfolgungszeitpunkt und -weg, von der Ausscheidungsgeschwindigkeit, Arzneistoffkombination und Schwere der jeweiligen Erkrankung, welcher die Therapie gilt. Die orale Applikation ist bevorzugt.

Die Verbindungen der Formel I und ihre Salze eignen sich, insbesondere bei topischer Anwendung, ferner zur Behandlung der Alopecia areata. Hierfür werden insbesondere pharmazeutische Zubereitungen verwendet, die zur topischen Behandlung der Kopfhaut geeignet und die oben genannt sind. Sie enthalten etwa 0,005 bis 10, bevorzugt 0,5 bis 3 Gew.% mindestens einer Verbindung der Formel I und/oder mindestens eines ihrer Salze. Im übrigen können diese Verbindungen gegen Alopezie in Analogie zu den Angaben in der WO 88/00822 verwendet werden.

In den nachfolgenden Beispielen bedeutet "übliche Aufarbeitung":

Man gibt, falls erforderlich, Wasser hinzu, extrahiert mit einem organischen Lösungsmittel wie Ethylacetat, trennt ab, trocknet die organische Phase über Natriumsulfat, filtriert, dampft ein und reinigt durch Chromatographie und/oder Kristallisation.

Vor- und nachstehend sind alle Temperaturen in °C angegeben.

#### Beispiel 1

Ein Gemisch von 1 g 2,2-Dimethyl-3,4-epoxy-6-cyan-chroman ("IIa"), 1,5 g 3-Hydroxy-1-phenyl-1,6-dihydro-pyridazin-6-on, 0,4 ml Pyridin und 35 ml Ethanol wird 14 Std. gekocht. Man dampft ein, chromato-

graphiert den Rückstand an Kieselgel und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol ("A"), F. 203-206°.

Analog erhält man aus den entsprechenden Epoxiden die nachstehenden 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-3-chromanole:

- 5 6-Nitro-
- 6-Fluor-
- 6-Chlor-
- 6-Brom-
- 6-Trifluormethyl-
- 10 6-Methoxycarbonyl-
- 6-Ethoxycarbonyl-

#### Beispiel 2

Ein Gemisch von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(6-oxo-1,6-dihydro-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol ("IVa"), 2 ml Allylbromid, 3 g Kaliumcarbonat und 50 ml Aceton wird 2 Std. gekocht; danach werden weitere 2 ml Allylbromid zugefügt, und das Gemisch wird weitere 2 Std. gekocht. Man dampft ein, arbeitet wie üblich auf und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol, F. 145-146°.

20 Analog erhält man die nachstehenden 2,2-Dimethyl-6-cyan-3-chromanole:

- 4-(1-Propargyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-, F. 185-186°
  - 4-[1-(2-Methoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Formylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 25 4-[1-(2-Acetylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Thioacetylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-(1-Carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-F. 212-216°
  - 4-(1-Methoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-, F. 170-172°
  - 4-(1-Ethoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 30 4-(1-Benzoyloxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-, F. 162-164°
  - 4-[1-(2-Nitroethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-(1-Cyanmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-, F. 201-203°
  - 4-[1-(2-Cyanethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 35 4-[1-(2-Fluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2,2,2-Trifluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Methylthio-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Methylsulfinyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Methylsulfonyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 40 4-(1-Benzyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-, F. 197-199°
- Weiterhin erhält man analog die nachstehenden 2,2,3-Trimethyl-6-cyan-3-chromanole:
- 4-(1-Allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-(1-Propargyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-[1-(2-Methoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 45 4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Formylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Acetylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Thioacetylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-(1-Carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 50 4-(1-Methoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-(1-Ethoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-(1-Benzoyloxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-[1-(2-Nitroethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 55 4-(1-Cyanmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-
  - 4-[1-(2-Cyanethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2-Fluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-
  - 4-[1-(2,2,2-Trifluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-

- 4-[1-(2-Methylthio-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfinyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfonyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Benzyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-;  
 5 die nachstehenden 2,2-Dimethyl-6-nitro-3-chromanole:  
 4-(1-Allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Propargyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Methoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 10 4-[1-(2-Formylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Acetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Thioacetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Methoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 15 4-(1-Ethoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Benzoyloxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Nitroethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Cyanmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 20 4-[1-(2-Cyanethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Fluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2,2,2-Trifluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylthio-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfinyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 25 4-[1-(2-Methylsulfonyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Benzyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-;  
 die nachstehenden 2,2-Dimethyl-6-brom-3-chromanole:  
 4-(1-Allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Propargyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 30 4-[1-(2-Methoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Formylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Acetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Thioacetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 35 4-(1-Carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Methoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Ethoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Benzoyloxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Nitroethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 40 4-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Cyanmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Cyanethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Fluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2,2,2-Trifluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 45 4-[1-(2-Methylthio-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfinyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfonyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Benzyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-;  
 die nachstehenden 2,2-Dimethyl-6-methoxycarbonyl-3-chromanole:  
 50 4-(1-Allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Propargyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Methoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Formylethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 55 4-[1-(2-Acetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Thioacetyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Methoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-

BEST AVAILABLE COPY

- 4-(1-Ethoxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-(1-Benzoyloxycarbonylmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Nitroethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 5 4-(1-Cyanmethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-  
 4-[1-(2-Cyanethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Fluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2,2,2-Trifluorethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylthio-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 10 4-[1-(2-Methylsulfinyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-[1-(2-Methylsulfonyl-ethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-  
 4-(1-Benzyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-;  
 sowie  
 2,2-Tetramethylen-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol  
 15 2,2-Pentamethylen-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol.

## Beispiel 3

- 20 Ein Gemisch von 1 g IVa, 0,67 ml Aziridin und 10 ml Dioxan wird im Bombenrohr 3 Std. auf 130°  
 erhitzt. Man dampft ein, löst den Rückstand in verdünnter Salzsäure, wäscht mit Dichlormethan, macht  
 alkalisch und arbeitet wie üblich auf. Das erhaltene 2,2-Dimethyl-4-[1-(2-aminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-  
 pyridazinyl-3-oxy]-6-cyan-3-chromanol wird aus Acetonitril/Diethylether 1:1 umkristallisiert. F. 167-169°.

Analog erhält man die folgenden 2,2-Dimethyl-4-[1-(2-aminoethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-

## 25 3-chromanole:

6-Nitro-

6-Fluor-

6-Chlor-

6-Brom-

## 30 6-Trifluormethyl-

6-Methoxycarbonyl-

6-Ethoxycarbonyl-

## 35 Beispiel 4

- In ein Gemisch von 1 g IVa, 1,6 g K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 35 ml Aceton wird unter Rühren und Kochen 8 Std.  
 Ethylenoxid eingeleitet. Man läßt über Nacht stehen, filtriert, dampft das Filtrat ein und erhält nach üblicher  
 Aufarbeitung 2,2-Dimethyl-4-[1-(2-hydroxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy]-6-cyan-3-chromanol, F.  
 40 152-154°.

Analog erhält man die folgenden 2,2-Dimethyl-4-[1-(2-hydroxyethyl)-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-  
 oxy]-3-chromanole:

6-Nitro-

6-Fluor-

## 45 6-Chlor-

6-Brom-

6-Trifluormethyl-

6-Methoxycarbonyl-

6-Ethoxycarbonyl-

50

## Beispiel 5

- Eine Lösung von 2,82 g 2,2-Dimethyl-4-brom-6-cyan-3-chromanol und 2,5 g 3-Hydroxy-1-phenyl-1,6-  
 55 dihydro-pyridazin-6-on in 70 ml DMSO wird mit 1,2 g 80%igem NaH versetzt und 3 Tage bei 20° gerührt.  
 Nach üblicher Aufarbeitung erhält man "A", F. 203-206°.

## Beispiel 6

Ein Gemisch von 1 g "A", 1,5 g dl-Campher-10-sulfonsäurechlorid und 15 ml Pyridin wird 1,5 Std. bei 90° gerührt. Man dampft ein, löst den Rückstand in Ethylacetat, wäscht mit verdünnter Salzsäure und mit Wasser, trocknet die organische Phase über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dampft erneut ein, löst in Dichlormethan und reinigt chromatographisch an Kieselgel. Man erhält 1,1 g eines Gemisches diastereomerer 4-Camphersulfonsäureester, das in 45 ml Methanol gelöst wird. Man gibt 6 g NaOH auf Träger (E. Merck, Art.Nr. 1567) hinzu, rührt 16 Std. bei 20°, dampft ein, arbeitet wie üblich auf und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromen neben wenig "A" (chromatographisch abgetrennt).

## Beispiel 7

Eine Lösung von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(1-benzyloxycarbonyl-methyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chroman in 15 ml Methanol wird an 0,3 g 5%ig. Pd-C bei 20° und 1 bar bis zum Stillstand hydriert. Man filtriert, dampft ein und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chroman, F. 212-216°.

## Beispiel 8

Ein Gemisch von 2 g "A", 11,7 ml Ameisensäure und 3,3 ml Acetanhydrid wird 16 Std. bei 20° stehengelassen und anschließend 2 Std. auf 40-42° erwärmt. Nach Eindampfen und üblicher Aufarbeitung erhält man 2,2-Dimethyl-3-formyloxy-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman.

Analog erhält man aus den entsprechenden 3-Hydroxychromanen:

2,2,3-Trimethyl-3-formyloxy-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman

2,2-Dimethyl-3-formyloxy-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman

2,2,3-Trimethyl-3-formyloxy-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman.

## Beispiel 9

Ein Gemisch von 1 g "A" und 5 ml Acetanhydrid wird 1 Std. gekocht. Man kühlt ab, arbeitet wie üblich auf und erhält 2,2-Dimethyl-3-acetoxy-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman.

Analog erhält man:

2,2,3-Trimethyl-3-acetoxy-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman

2,2-Dimethyl-3-acetoxy-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman

2,2,3-Trimethyl-3-acetoxy-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-chroman.

## Beispiel 10

Eine Lösung von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-nitro-3-chroman in 25 ml Methanol wird bei 20° und 1 bar an 0,5 g 5%igem Pd-C bis zum Stillstand hydriert. Man filtriert, dampft ein und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-amino-3-chromanol.

Analog erhält man:

2,2,3-Trimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-amino-3-chromanol.

## Beispiel 11

Eine Lösung von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-amino-3-chromanol in 15 ml HCOOH und 1 ml Pyridin wird 19 Std. gekocht und eingedampft. Nach üblicher Aufarbeitung erhält man 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-formamido-3-chromanol.

## Beispiel 12

Ein Gemisch von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-amino-3-chroman-  
10 nol, 10 ml Acetanhydrid und 10 ml Pyridin wird 16 Std. bei 20° stehengelassen. Man dampft ein, reinigt  
chromatographisch und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-acetamido-3-  
chromanol.

5

#### Beispiel 13

In eine siedende Lösung von 1 g "A" in 50 ml Methanol und 2 ml Wasser wird 14 Std. unter Rühren  
10 HCl eingeleitet. Man läßt erkalten und über Nacht stehen. Die ausgefallene 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-  
dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-3-chromanol-6-carbonsäure wird abfiltriert.

#### Beispiel 14

15

Ein Gemisch von 3 g "A", 31 g Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>·12 H<sub>2</sub>O, 28 ml Pyridin, 28 ml Wasser, 67 ml Essigsäure und  
25 g Raney-Ni (wasserfeucht) wird bei 20° 3 Std. gerührt. Nach Filtra tion arbeitet man wie üblich auf und  
erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-formyl-3-chromanol, F. 256-257°.

20

#### Beispiel 15

Man löst 3 g "A" in 40 ml tert.-Butanol und gibt unter Rühren 5,6 g gepulvertes KOH hinzu. Nach 1  
Std. Kochen und üblicher Aufarbeitung erhält man 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1, 6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-  
25 3-oxy)-6-carbamoyl-3-chromanol.

#### Beispiel 16

In eine Lösung von 3 g "A" in einem Gemisch von 20 ml Pyridin und 10 ml Triethylamin leitet man 5  
30 Std. bei 20° H<sub>2</sub>S ein, dampft ein, arbeitet wie üblich auf und erhält 2,2-Dimethyl-4-(1-phenyl-1,6-dihydro-6-  
oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-thiocarbamoyl-3-chromanol.

Die nachstehenden Beispiele betreffen pharmazeutische Zubereitungen, welche Verbindungen der  
Formel I und/oder deren physiologisch unbedenkliche Salze enthalten.

35

#### Beispiel A Tabletten

Ein Gemisch von 1 g 2,2-Dimethyl-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol, 4  
40 kg Lactose, 1,2 kg Kartoffelstärke, 0,2 kg Talk und 0,1 kg Magnesiumstearat wird in üblicher Weise zu  
Tabletten gepreßt, derart, daß jede Tablette 0,1 mg Wirkstoff enthält.

#### Beispiel B Dragees

45

Analog Beispiel A werden Tabletten gepreßt, die anschliessend in üblicher Weise mit einem Überzug  
aus Saccharose, Kartoffelstärke, Talk, Tragant und Farbstoff überzogen werden.

#### Beispiel C Kapseln

50

Man füllt 1 kg 2,2,3-Trimethyl-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol in übli-  
cher Weise in Hartgelatine kapseln, so daß jede Kapsel 0,5 mg Wirkstoff enthält.

55

#### Beispiel D Ampullen


Eine Lösung von 10 g Na-Salz von 2,2-Dimethyl-4-(1-carboxymethyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-

oxy)-6-cyan-3-chromanol in 70 l 1,2-Propandiol wird mit zweifach destilliertem Wasser auf 100 l aufgefüllt, steril filtriert, in Ampullen abgefüllt und steril verschlossen. Jede Ampulle enthält 0,1 mg Wirkstoff.

Analog sind Tabletten, Dragees, Kapseln oder Ampullen erhältlich, die einen oder mehrere der übrigen Wirkstoffe der Formel I und/oder ihrer physiologisch unbedenklichen Salze enthalten:

## Ansprüche

### 1. Chromanderivate der Formel I



worin

R<sup>1</sup> A,

R<sup>2</sup> und R<sup>8</sup> jeweils H oder A,

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> zusammen auch Alkylen mit 3-6 C-Atomen,

R<sup>3</sup> OH, OA oder OAc,

R<sup>4</sup> H,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen auch eine Bindung,

R<sup>5</sup> Ar oder C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>-R<sup>8</sup>,

R<sup>9</sup> Alkenyl oder Alkynyl mit jeweils 2-4 C-Atomen, OH, OA, CHO, CO-A, CS-A, COOH, COOA, COO-alkyl-Ar, CS-OA, NO<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub>, NHA, NA<sub>2</sub>, CN, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, SA, SO-A, SO<sub>2</sub>-A oder Ar,

Ar eine unsubstituierte oder eine ein- oder zweifach durch R<sup>10</sup> substituierte Phenylgruppe,

R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>10</sup> jeweils H, A, HO, AO, CHO, ACO, CF<sub>3</sub>CO, ACS, HOOC, AOOC, AO-CS, ACOO, A-CS-O,

Hydroxy-alkyl, Mercapto-alkyl, NO<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub>, NHA, NA<sub>2</sub>, CN, F, Cl, Br, J, CF<sub>3</sub>, AS, ASO, ASO<sub>2</sub>, AO-SO, AO-

SO<sub>2</sub>, AcNH, AO-CO-NH, H<sub>2</sub>NSO, HANSO, A<sub>2</sub>NSO, H<sub>2</sub>NSO<sub>2</sub>, HANSO<sub>2</sub>, A<sub>2</sub>NSO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>NCO, HANCO, A<sub>2</sub>NCO,

H<sub>2</sub>NCS, HANCS, A<sub>2</sub>NCS, ASONH, ASO<sub>2</sub>NH, AOSONH, AOSO<sub>2</sub>NH, ACO-alkyl, Nitro-alkyl, Cyan-alkyl, A-C

(=NOH), A-C(=NNH<sub>2</sub>), H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub> oder A<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>,

n 1, 2 oder 3,

A Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

-alkyl Alkylen mit 1-6 C-Atomen und

Ac Alkanoyl mit 1-8 C-Atomen oder Aroyl mit 7-11 C-Atomen


bedeuten,

sowie deren Salze.

2. (2,2-Dimethyl-4-(1-allyl-1,6-dihydro-6-oxo-pyridazinyl-3-oxy)-6-cyan-3-chromanol.

3. Verfahren zur Herstellung von Chromanderivaten der Formel I gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Chroman der Formel II






II

10 worin

X-Y




oder




und

15 E Cl, Br, J oder eine reaktionsfähig veresterte OH-Gruppe bedeuten und  
R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die bei Formel I angegebenen Bedeutungen haben,  
mit einer Verbindung der Formel III



III

20  
25 worin R<sup>5</sup> die bei Formel I angegebene Bedeutung hat oder mit einem ihrer reaktionsfähigen Derivate  
umsetzt oder daß man eine Verbindung der Formel IV



IV

35  
40  
45 worin R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die bei Formel I angegebenen Bedeutungen haben,  
oder eines ihrer reaktionsfähigen Derivate  
mit einer Verbindung der Formel  
E-R<sup>5</sup> V

50 worin R<sup>5</sup> und E die bei Formel I bzw. bei Formel II angegebenen Bedeutungen haben  
oder einem ihrer reaktionsfähigen Derivate  
umsetzt

und/oder daß man eine Verbindung der Formel I, worin R<sup>3</sup> OH und R<sup>4</sup> H bedeutet, dehydratisiert und/oder  
daß man in einer Verbindung der Formel I einen oder mehrere der Reste R<sup>3</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und/oder R<sup>7</sup> in andere  
55 Reste R<sup>3</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und/oder R<sup>7</sup> umwandelt und/oder daß man eine basische Verbindung der Formel I durch  
Behandeln mit einer Säure in eines ihrer Säureadditionssalze umwandelt.

4. Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine  
Verbindung der Formel I und/oder eines ihrer physiologisch unbedenklichen Salze zusammen mit minde-

stens einem festen, flüssigen oder halbfüssigen Träger- oder Hilfsstoff in eine geeignete Dosierungsform bringt.

5. Pharmazeutische Zubereitung, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einer Verbindung der Formel I und/oder einem ihrer physiologisch unbedenklichen Salze.

5 6. Verbindungen der Formel I zur Bekämpfung von Krankheiten.

7. Verwendung von Verbindungen der Formel I zur Herstellung eines Arzneimittels.

8. Verwendung von Verbindungen der Formel I bei der Bekämpfung von Krankheiten.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55